

# Gastroscoopie

Uw arts heeft met u afgesproken een onderzoek te plannen van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm. Voor dit onderzoek is het belangrijk dat nuchter bent. In deze folder wordt uitgelegd hoe het onderzoek in zijn werk gaat.

## Algemene informatie over (de voorbereiding van) de scopie

Een gastroscoopie is een onderzoek waarbij met behulp van een flexibele slang het slijmvlies van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm wordt bekeken. Deze slang heeft aan de tip een lampje met camera en wordt via uw mond in uw maag gebracht. Het onderzoek duurt ongeveer 5-10 minuten.

## Vorbereiding

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. U mag tot 5 uur vóór het onderzoek nog licht ontbijten met twee beschuitjes met jam (zonder boter) en een kopje thee (zonder melk). Daarna mag u niets meer eten, drinken of roken. Als u medicijnen gebruikt kunt u deze innemen na afloop van het onderzoek. Wanneer u gewend bent 's ochtends uw medicatie in te nemen mag u dit uitstellen tot na het onderzoek. Overleg bij twijfel met uw verwijzend arts. Als u een gebitsprothese, losse elementen of een mondpiercing draagt, doet u deze vóór het onderzoek uit. Draagt u een bril, zet deze dan af tijdens het onderzoek.

Als u diabetespatiënt bent kan het noodzakelijk zijn om voor het onderzoek de medicatie aan te passen, overleg dit met de arts die u verwezen heeft voor het onderzoek.

## Het onderzoek

Een kwartier voor het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de receptie van MCV Nederland. Vervolgens neemt u plaats in de wachtkamer waar de verpleegkundige u ophaalt om u naar de scopie afdeling te begeleiden. U krijgt een korte uitleg over het onderzoek en de verpleegkundige zal u wat veiligheidsvragen stellen.

## Het onderzoek zelf

- In sommige gevallen krijgt u een verdoving van de keel en een drankje om schuimvorming in de maag tegen te gaan. Indien u een keelverdoving heeft gekregen betekent dit dat u na het onderzoek een half uur niet mag eten en drinken.
- U wordt verzocht in linker zijligging plaats te nemen op de onderzoeksbank.
- U krijgt een plastic ring tussen uw tanden om de slang te beschermen.
- De flexibele slang wordt voorzien van verdovende gelei en via uw mond geïntroduceerd. De arts/verpleegkundige zal u vragen te slikken waarna de slang langzaam naar slokdarm, maag en twaalfvingerige darm wordt opgevoerd.
- Wanneer nodig worden stukjes slijmvlies (biopten) weggenomen voor nader onderzoek. Dit is niet pijnlijk, u voelt dit niet.

### De nazorg:

- Na afloop van het onderzoek zal de arts de bevindingen met u bespreken en eventueel vervolgafspraken maken.
- Na het onderzoek mag u eten en drinken, tenzij anders afgesproken door de arts die het onderzoek heeft verricht.

### Complicaties

Slechts in zeldzame gevallen treden complicaties op als gevolg van het onderzoek zoals:

- Hevige plotselinge buikpijn, of pijn die niet binnen enkele dagen verdwijnt.
- Koorts
- Plotseling hevig bloedverlies, of bloedverlies dat niet binnen enkele dagen verdwijnt.

Mocht zich één van deze symptomen bij u voordoen, neemt u dan direct contact met ons op, wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

### Bereikbaarheid/ vragen

Als u nog vragen heeft of problemen ondervindt, kunt u tijdens en buiten (voor dringende gevallen) kantooruren contact opnemen met MCV via telefoonnummer 088 –5385555.